

LONDON
SCHOOL of
HYGIENE
& TROPICAL
MEDICINE



Williams, KM; Bertelsen, G; Cumberland, P; Wolfram, C; Verhoeven, VJ; Anastasopoulos, E; Buitendijk, GH; Cougnard-Grgoire, A; Creuzot-Garcher, C; Erke, MG; Hogg, R; Hhn, R; Hysi, P; Khawaja, AP; Korobelnik, JF; Ried, J; Vingerling, JR; Bron, A; Dartigues, JF; Fletcher, A; Hofman, A; Kuijpers, RW; Luben, RN; Oxele, K; Topouzis, F; von Hanno, T; Mirshahi, A; Foster, PJ; van Duijn, CM; Pfeiffer, N; Delcourt, C; Klaver, CC; Rahi, J; Hammond, CJ; European Eye Epidemiology (E(3)) Consortium (2015) Increasing Prevalence of Myopia in Europe and the Impact of Education. *Ophthalmology*. ISSN 0161-6420 DOI: 10.1016/j.ophtha.2015.03.018

Downloaded from: <http://researchonline.lshtm.ac.uk/2182499/>

DOI: [10.1016/j.ophtha.2015.03.018](https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2015.03.018)

Usage Guidelines

Please refer to usage guidelines at <http://researchonline.lshtm.ac.uk/policies.html> or alternatively contact researchonline@lshtm.ac.uk.

Available under license: <http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/>

Age	Birth decade						
	1910-1919	1920-1929	1930-1939	1940-1949	1950-1959	1960-1969	1970-1979
40-44					42.4 (21.6-63.2)	37.5 (25.7-49.3)	51.6 (22.4-80.9)
45-49				*	36.9 (27.6-46.2)	35.6 (28.5-42.8)	
50-54				21.6 (14.2-29.1)	31.7 (27.0-36.5)	40.0 (33.0-47.0)	
55-59			22.6 (20.2-25.0)	25.3 (21.9-28.7)	31.0 (28.1-33.9)		
60-64		15.2 (12.7-17.7)	16.4 (13.2-19.5)	21.9 (18.8-25.0)	29.7 (18.9-40.4)		
65-69	12.1 (9.5-14.7)	13.9 (11.2-16.5)	14.6 (12.0-17.1)	19.2 (16.5-21.9)			
70-74	15.4 (13.0-17.8)	12.1 (8.8-15.3)	14.1 (11.4-16.7)	17.8 (10.9-24.8)			
75-79	14.8 (10.9-18.6)	16.2 (13.6-18.7)	13.6 (10.4-16.7)				

Table 2 Prevalence of myopia (Spherical Equivalent \leq -0.75 Diopters) against birth year stratified by age. Individuals aged 40 to 79 included. (* = meta-analysis not possible due to single contributing prevalence estimate)